IPERTENSIL

Flacone 50 ml e

Modo d'uso
Da 20 a 50 gocce tre volte al dì. Al bisogno 20 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte. Adeguare comunque la posologia alle condizioni individuali.

Indicazioni salutistiche
Utile per coadiuvare i livelli fisiologici della pressione arteriosa nell'ipertensione arteriosa sistolica e diastolica con sintomi correlati, ipertensione arteriosa su base psicosomatica, nevrosi cardiache, cardiopatia congestizia, ipertono adrenergico, aritmie cardiache, cuore senile, dispnea cardiaca, ipertono surrenalico funzionale, retinopatia ipertensiva.

Composizione
Acqua, Alcool etilico, Glicerina, Olivo (*Olea europaea* L.) foglie e sùrculi, Coleus (*Coleus forskohlii* Brit.) radici, Ibisco (*Hibiscus sabdariffa* L.) fiori, Biancospino (*Crataegus laevigata* (Poir) DC.) foglie, fiori e frutti, Pilosella (*Hieracium pilosella* L.) erba, Vischio (*Viscum album* L.) foglie e sùrculi.

Componenti per dose giornaliera media pari a 3 ml e per 100 mL		
Componenti	per 3 mL	per 100 mL
Olivo	0.75 mL	25 mL
Coleus	0.60 mL	20 mL
Ibisco	0.60 mL	20 mL
Biancospino	0.45 mL	15 mL
Pilosella	0.30 mL	10 mL
Vischio	0.30 mL	10 mL



Biogroup srl
Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. +39 0874 870014
Fax +39 0874 870973
www.biogroup.it
info@biogroup.it

Pubblicazione riservata alla classe medica e agli operatori del settore (Art. 6 comma 2 – D.L. 27.01.1992 n.111) © Sigmastudio 2019 – P4-IPTEN-2.01/19

IPERTENSIL

Ipertensil è utile nel coadiuvare i fisiologici livelli di pressione arteriosa. Grazie all'innovativa formulazione Ipertensil agisce a più livelli sulle cause dell'ipertensione. La sua formulazione è indicata inoltre per svolgere un'azione preventiva in chi è predisposto a innalzamento della pressione, sia su base costituzionale che per cause secondarie. In base ai dati di letteratura scientifica gli estratti vegetali presenti nel prodotto risultano estremamente sicuri e di ottima tollerabilità.

azione diuretica

Pilosella (*Hieracium pilosella* L.) erba
La pianta è dotata di una spiccata attività diuretica, antiurica, declorurante ed antisettica. L'effetto diuretico è da attribuirsi soprattutto ai flavonoidi (luteoloside).

azione anti-ipetensiva

Vischio (*Viscum album* L.) foglie e sùrculi
La presenza di amine e flavonoidi spiega le proprietà anti-ipertensive del Vischio. Si suppone che tali sostanze stimolino il parasimpatico e diminuiscano la resistenza periferica per vasodilatazione. Saponosidi e flavonoidi inoltre rinforzano la diuresi e favoriscono l'escrezione di urea. Diversi studi hanno convalidato la teoria che preparati a base di Vischio non solo determinano una riduzione dell'ipertensione arteriosa ma, in un gran numero di casi, promuovono un miglioramento dei disturbi soggettivi derivanti dall'ipertensione come cefalea, vertigini e dolori pericardici.

effetto ACE inibitore

Ibisco (*Hibiscus sabdariffa* L.) fiori
Diversi studi hanno messo in luce gli effetti delle preparazioni a base di Ibisco sul sistema circolatorio, confermando la capacità della pianta di inibire l'enzima di conversione dell'angiotensina I (ACE) e le proprietà angioprotettive. L'effetto ACE-inibitore è stato attribuito ai composti flavonici mentre l'attività angioprotettrice è funzione delle antocianidine.

azione modulante l'attività cardiaca

Biancospino (*Crataegus laevigata* (Poir) DC.) foglie, fiori e frutti
Il Biancospino svolge azioni inotrope positive, dovute all'inibizione della c-AMP-fosfodiesterasi, rinforza e rallenta le contrazioni del miocardio, ne modula l'eccitabilità e assicura un'ottimale conducibilità degli impulsi nervosi.

effetto vasodilatatore

Olivo (*Olea europaea* L.) foglie e sùrculi
Dal punto di vista clinico le foglie di Olivo possono essere impiegate nelle forme di ipertensione arteriosa di grado moderato. L'effetto ipotensivo si raggiunge tramite un meccanismo di vasodilatazione periferica. È importante ricordare che l'Olivo è utile anche nei disturbi associati all'ipertensione come la cefalea, le vertigini e il ronzio.

Coleus (*Coleus forskohlii* Brit.) radici
Il Forskolin riduce la pressione sanguigna. Test sugli animali evidenziano un effetto inotropo positivo, inibisce la contrazione indotta da norepinefrina e la contrazione da angiontensina. Studi preliminari sull'uomo hanno mostrato che il Forskolin aumenta la contrattilità del tessuto miocardico senza aumentare la richiesta di ossigeno, evidenziando così un effetto vasodilatatore. Il Coleus, inoltre, possiede azione antiaggregante piastrinica e quindi fluidifica il sangue e previene la trombosi.

BIOGROUP®
in natura vinces