



Potenziamento Sistema Immunitario

PREPARATI	INDICAZIONI	POSOLOGIA
ECHINACEA 400 plus fiale per uso orale	Prevenzione e cura, in caso di problematiche relative all'apparato ORL e respiratorio: patologie infettive ed infiammatorie stagionali, sinusiti, otiti, tonsilliti, faringolaringiti, bronchiti.	PREVENZIONE: una fiala ogni 5-7 giorni da settembre ad aprile. CURA: una fiala mattina e sera per tutto il tempo necessario. DOSAGGIO PEDIATRICO: ridurre proporzionalmente la dose secondo parere del prescrittore.
COLOSTRUM UNICIS capsule	Prevenzione e cura, in caso di problematiche relative all'apparato digerente: patologie infettive ed infiammatorie stagionali, gastroenteriti, malattie intestinali croniche, gastropatie.	PREVENZIONE: una capsula la sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: una capsula mattina e sera per tutto il tempo necessario. DOSAGGIO PEDIATRICO: le capsule possono essere aperte e somministrate anche in bambini piccoli; ridurre proporzionalmente la dose secondo parere del prescrittore.
KAPPAPHYT 10 compresse	Prevenzione e cura, in caso di problematiche infettive ed infiammatorie a carattere generale. Anemia. Terapia di supporto in gravidanza e nelle problematiche oncologiche.	PREVENZIONE: una compressa mattina e sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: una capsula da due a tre volte al dì, per tutto il tempo necessario.
TRIGNO T soluzione	Prevenzione e cura in caso di infezioni batteriche e virali.	PREVENZIONE: 10 ml la sera CURA: 15 ml due volte al giorno.

PREPARATI	INDICAZIONI	POSOLOGIA
BIODIT UNO gocce	Prevenzione e cura, in caso di problematiche a carattere infettivo, infiammatorio, tossico, iatrogeno, in cui occorra un'azione detossinante, antiossidante e tonica sul sistema immunitario.	PREVENZIONE: 20 gocce mattina e sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: 20 gocce tre volte al dì, per tutto il tempo necessario.
BIODIT VIR bustine	Prevenzione e cura, in caso di problematiche a carattere infettivo virale con tropismo diretto o indiretto a livello epatico, in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi.	PREVENZIONE: una bustina la sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: una bustina mattina e sera.
DRENOVAX gocce	Prevenzione e cura in caso di problematiche dovute a terapie con probabile rischio di danno iatrogeno.	PREVENZIONE: 20 gocce mattina e sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: 20 gocce tre volte al dì per tutto il tempo necessario. DOSAGGIO PEDIATRICO: ridurre proporzionalmente la dose secondo parere del prescrittore.
BIODIT VITA compresse	Immunomodulazione di base in caso di problematiche infettive, degenerative, infiammatorie, iatrogene ed oncologiche, con marcato deficit del sistema di difesa.	PREVENZIONE: una compressa mattina e sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: una compressa da due a tre volte al dì, per tutto il tempo necessario.
KAPPAPHYT 8 bustine	Azione micoterapica di base in caso di problematiche infettive, degenerative, infiammatorie, iatrogene ed oncologiche, con marcato deficit del sistema di difesa.	PREVENZIONE: una bustina la sera per un periodo di almeno due mesi. CURA: una bustina da due a tre volte al dì, a seconda del caso, per tutto il tempo necessario.
KAPPAPHYT 9 capsule	Prevenzione e cura in caso di problematiche associate alla carenza di oligoelementi e/o elementi minerali, cofattori essenziali di numerose attività enzimatiche cellulari.	PREVENZIONE: Una capsula una volta al giorno CURA: Una capsula due volte al giorno.
BIOPHYT ACQUA gocce	Immunostimolazione di base in soggetti con scarsa reattività ed energia del sistema di difesa.	PREVENZIONE: 20 gocce mattina e sera per un periodo di almeno due mesi insieme a BIOPHYT LUES. CURA: 20 gocce tre volte al dì insieme a BIOPHYT LUES, per tutto il tempo necessario.
BIOPHYT LUES gocce	Immunostimolazione di base in soggetti con scarsa reattività ed energia del sistema di difesa.	PREVENZIONE: 20 gocce mattina e sera per un periodo di almeno due mesi insieme a BIOPHYT ACQUA. CURA: 20 gocce tre volte al dì, insieme a BIOPHYT ACQUA per tutto il tempo necessario.

- L'assunzione di tutti i preparati deve avvenire lontano dai pasti: almeno 30' prima o 60' dopo.
- I preparati, tra loro, possono essere assunti a pochi minuti di distanza.
- I preparati in gocce possono essere versati, per l'intera dose giornaliera, insieme, in una bottiglietta d'acqua il cui contenuto va sorseggiato, a digiuno e dopo aver agitato bene, durante l'arco della giornata.
- Le associazioni dei preparati e la loro posologia, a seconda del caso, sono a discrezione del prescrittore, per cui le indicazioni di cui sopra sono solo ed unicamente da intendersi come schema di riferimento.



Biogroup srl
Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. +39 0874 870014

Fax +39 0874 870973
www.biogroup.it
info@biogroup.it