



# HOMEOPATHYA FITOINTEGRATA BIOGROUP

## ELENCO SCHEDE TECNICHE DEI RIMEDI HB IN ORDINE PROGRESSIVO

Aggiornato Gennaio 2024

**Biogroup SpA Società Benefit**

Variante Esterna, snc

Tel. 0874.870014 – Fax 0874.1865244

[www.biogroup.it](http://www.biogroup.it)

[info@biogroup.it](mailto:info@biogroup.it)

*Materiale riservato alla classe medica e al farmacista (art. 6 comma 2- DL.27.01.1992 n. 111).  
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo senza il permesso scritto dell'editore.*

# HB 1 INFLU



FEBBRE, INFLUENZA, FLOGOSI PRIME VIE AEREE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

## Composizione e principi attivi:

*Eupatorium perfoliatum 9DH:* infezioni catarrali, febbre, tosse secca, influenza, malattie da raffreddamento.

*Gelsemium sempervirens 12DH:* febbre senza sete e con brividi di freddo, congestione della testa, astenia, intorpidimento, influenza con irritazione meningea.

*Aconitum napellus 9DH:* stati di raffreddamento acuti, stati influenzali con febbre violenta, brividi, tosse secca, iperemia delle prime vie respiratorie, irrequietezza.

*Atropa belladonna 7DH:* stati febbrili con congestione delle prime vie aeree. *Bryonia 7DH:* riniti con mucose secche, tracheiti, bronchiti.

*Ferrum phosphoricum 15DH:* affezioni febbrili e infiammatorie, rinofaringiti acute spesso in presenza di otalgie.

*Rhus toxicodendron 7DH:* stati influenzali adinamici, affezioni di natura batterica e virale.

## HB 2 FLOGOSIL



TONSILLITI, FARINGITI, OTITI, CONGIUNTIVITI, MALATTIE INFETTIVE, FLOGOSI DELLE MUCOSE E DELLA CUTE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterrecci. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Belladonna 9DH:* stati febbrili con congestione delle prime vie aeree, scarlattina, dermatosi erisipeloidi, metriti.

*Aconitum napellus 8DH:* stati di raffreddamento acuti, stati influenzali con febbre, brividi, iperemia delle prime vie respiratorie, nevralgie.

*Bryonia 9DH:* faringo-laringiti, bronchiti, stati infiammatori delle mucose, reumatismo articolare e muscolare.

*Mercurius solubilis 8DH:* infiammazioni della cavità orale, del canale gastro-intestinale e del sistema linfatico, riniti, tonsilliti, stomatiti, gengiviti, otiti, sinusiti, dissenteria, blefariti, congiuntiviti, dermatiti, foruncolosi, annessiti, periostiti.

*Phytolacca decandra 9DH:* infezione influenzale, tonsillite, reumatismo muscolare ed articolare.

*Echinacea angustifolia 6DH:* processi settici, linfadenite, mastiti, pielite, suppurazioni.

## HB 3 LARINT



### LARINGITI, TRACHEITI

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Flogosi acute della mucosa laringo-tracheale: laringiti acute e croniche, disfonie, afonia dei cantanti e degli insegnanti, raucedine.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

#### **Composizione e principi attivi:**

*Arnica montana 15DH:* azione antinfiammatoria ed antiedemigena.

*Phosphorus 30DH:* raucedine sino ad afonia, irritazione e solletico alla trachea.

*Arum triphyllum 9DH:* riniti, faringo-laringiti, raucedine, afonia.

*Argentum metallicum 7DH:* laringiti, stati catarrali delle mucose, dolore come da puntura.

*Causticum hahnemanni 12DH:* laringo-faringiti, raucedine e tosse che partono dalla laringe.

## HB 4 AERFLOG



TOSSE, BRONCOSPASMO, TRACHEO-BRONCHITI, FLOGOSI  
MUCOSE DELLE PRIME VIE AEREE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Affezioni acute e sub-acute delle mucose, in special modo delle prime vie respiratorie: tosse faringea o tracheale, bronchite spasmodica, laringite e tracheo-bronchite acuta e cronica.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Bryonia 9DH:* faringo-laringite, bronchite secca, tosse influenzale che peggiora con il caldo, pleurite, polmonite.

*Drosera 12DH:* tosse irritativa spasmodica con dolori dietro lo sterno, attacchi notturni di tosse, tosse a salve.

*Rumex crispus 6DH:* tosse irritativa, tormentosa e duratura, soprattutto notturna, tosse come se ci fosse una penna nella laringe, tosse con dolore trafittivo nei polmoni.

*Hepar sulfuris 30DH:* sensazione di scheggia o filo nella gola, catarri cronici delle vie respiratorie.

# HB 6 SINUSAN



## SINUSITI ACUTE E CRONICHE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Affezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### Composizione e principi attivi:

*Strychnos nux vomica 7DH:* sensazione d'intondimento e confusione nella testa e sopra gli occhi.

*Kalium bicromicum 9DH:* sinusite cronica, infiammazione dei seni frontali, della mucosa della bocca e tonsille, faringo-laringiti, catarro denso e tenace, cefalee della radice del naso e sovra orbitarie.

*Kalium jodatum 7DH:* stati flogistici delle mucose delle vie respiratorie superiori, rinite, sinusite.

*Hydrastis canadensis 7DH:* stati catarrali delle vie respiratorie superiori, stati irritativi delle mucose, azione vaso costringitiva.

*Mercurius corrosivus 15DH:* sinusite con caratteri d'infezione marcata.

*Hepar sulfur 12DH:* catarrri suppuranti dei seni frontali.

## **HB 7** BRONCAT



BRONCHITI, BRONCOPOLMONITI

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Processi flogistici catarrali, acuti e cronici della mucosa bronchiale: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, affezioni tubercolari.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Phosphorus 60DH:* bronco-polmoniti, stati di esaurimento dopo malattie infettive.

*Kalium carbonicum 7DH:* irritazione eccessiva delle mucose delle vie respiratorie, catarro cronico delle vie respiratorie, tosse secca.

*Antimonium tartaricum 9DH:* bronchiti acute e croniche, insufficienza respiratoria, asma.

*Ipeca 7DH:* bronchiti, asma bronchiale, emicrania, pertosse, stati infiammatori delle mucose dell'apparato respiratorio.

*Natrum sulfuricum 7DH:* infiammazione delle mucose delle vie respiratorie con eccessiva sensibilità al freddo.

*Pulsatilla 15DH:* rinofaringiti recidivanti, riniti allergiche, bronchiti catarrali.

*Hepar sulphur 7DH:* faringo-laringiti, bronchiti, stati irritativi delle mucose, tosse dura con scarso espettorato provocata da aria fredda e secca.

## HB 8 BRONCASM



ASMA BRONCHIALE, FLUIDIFICANTE CATARRALE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al di; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### Composizione e principi attivi:

*Arsenicum album 15DH:* crisi d'asma con recrudescenza notturna.

*Carbo vegetabilis 12DH:* bronchite cronica, enfisema.

*Kalium carbonicum 15DH:* catarro cronico delle vie respiratorie superiori, tosse.

*Tartarus stibiatus 7DH:* affezioni polmonari, dispnee, mucosità, espettorazione difficile.

*Sambucus 9DH:* catarro da raffreddamento febbrile, asma bronchiale, laringospasmi, rinite acuta.

*Bryonia 7DH:* bronchite secca, pleurite, polmonite.

## HB 11 DERMOVERIT



DERMATITI VESCICOLO ERITEMATOSE, HERPES

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Dermatiti vescicolo-eritematose della cute; *Herpes simplex*, *Herpes zoster*, erisipela, varicella.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### Composizione e principi attivi:

*Arsenicum album 9DH:* eczemi, dermatiti, nevriti.

*Daphne Mezereum 12DH:* eczema, eritema, Herpes, nevralgie, infiammazioni cutanee con prurito e vesciche.

*Rhus toxicodendron 15DH:* dermatiti bollose, eruzioni cutanee con bruciore e prurito, nevriti, nevralgie.

*Ranunculus bulbosus 7DH:* eruzioni cutanee da *Herpes* od erpetiformi.

## HB 18 PARASSIL



### PARASSITOSI INTESTINALE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Tutte le forme di parassitosi intestinali e sintomi correlati: stati irritativi del sistema nervoso, tic, chorea minor, spasmi, contrazioni muscolari, irritabilità psicofisica, contratture e spasmi addominali, ecc.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*China 6DH:* parassitosi intestinale e sintomi correlati.

*Cuprum metallicum 8DH:* spasmi della muscolatura liscia e trasversalmente rigata, coliche gastro-intestinali, gastroenteriti acute.

*Natrium muriaticum 5DH:* fame eccessiva, nevrastenia generale.

*Natrium phosphoricum 7DH:* pirosi, iperacidità, dispepsia fermentativa.

## HB 20 SPASMOCOL



COLICHE GASSOSE, COLICHE BILIARI E RENALI, TENESMO RETTALE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Colocynthis 15DH:* tenesmi gastrointestinali, coliche, alterazioni della muscolatura liscia degli intestini.

*Cuprum metallicum 4DH:* spasmi della muscolatura liscia e trasversalmente rigata, coliche gastro-intestinali, gastroenteriti acute.

*Plumbum metallicum 9DH:* costipazione spastica, coliche gastro-intestinali e ombelicali, spasmi degli sfinteri.

*Bryonia 12DH:* dolore ipocondrio destro, pressione sullo stomaco di mattina e dopo mangiato.

*Chamomilla 7DH:* coliche flatulenti.

## HB 22 EPATOPANC



INSUFFICIENZA PANCREATICA, STEATOSI EPATICA, INSUFFICIENZA BILIARE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Dispepsia gastro-epatica con insufficienza secretiva pancreatica, pancreatiti acute e croniche, stasi biliari, steatosi epatica.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Lycopodium clavatum 60DH:* epatopatie croniche, insufficienza epatica calcoli biliari, stasi della vena porta, meteorismo con disturbi epatici.

*Phosphorus 60 DH:* gastrite, epatite, congestione epatica, steatosi.

*Silybum marianum 6DH:* epatopatie, insufficienza epatica, congestione epatica.

## HB 24 EMORRID



EMORROIDI, RAGADI, CONGESTIONE EPATO-PORTALE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Congestione acuta e cronica epato-portale ed emorroidaria: emorroidi, eczema perianale, ragadi anali.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Hamamelis virginiana 12DH:* emorroidi, emorragie venose, varici, stasi venose.

*Lycopodium clavatum 30DH:* costipazione spastica con emorroidi sanguinanti, epatopatie croniche, calcoli biliari e renali, stasi della vena porta, meteorismo con disturbi epatici.

*Aesculus hippocastanum 6DH:* emorroidi, stasi venosa, varici, stasi della vena porta.

*Aloe 7DH:* addome pieno, pesante, gonfio, flatulenza, pressione verso il retto con dolore dopo la defecazione, stasi della vena porta, emorroidi che migliorano con il freddo.

## HB 26 FLOGONERV



LOMBOSCIATALGIE, NEVRALGIE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml. Fiale, 10 fiale da 2 ml.

**Indicazioni:** Lombosciatalgie, dolori nevralgici, crampoidi, taglienti, senso di intorpidimento, parestesie.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

Una fiala al giorno in fase acuta altrimenti da 1 a 3 volte a settimana.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Colocyntis 6-10-30DH:* nevralgie soprattutto a carico del nervo sciatico.

*Gnaphalium polycephalum 6-10-30DH:* sciatalgia, lombalgia, nevrite lombo- sacrale.

*Magnesium phosphoricum 9-10DH:* crampi ai polpacci, sciatica, nevralgie, nevrosi spasmodiche.

## HB 27 CONTRADOL



### ANTIDOLORIFICO

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml. Fiale, 10 fiale da 2 ml.

**Indicazioni:** Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico ed osseo.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

Una fiala al giorno in fase acuta altrimenti da 1 a 3 volte a settimana.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### Composizione e principi attivi:

*Arnica 9DH:* azione antinfiammatoria, nevralgie, mialgie, sciatica.

*Bryonia 12DH:* dolore muscolare iperacuto di tipo pungente, strappante, peggiora con il movimento, migliora con il riposo; reumatismo muscolare ed articolare.

*Causticum 15DH:* dolori laceranti, strappanti, tendinite, contratture, artralgie, rachialgie con irrigidimento, coxartrosi.

*Dulcamara 7DH:* reumatismi articolari e muscolari come conseguenza di raffreddamento ed umidità.

*Magnesium phosphoricum 7DH:* dolori crampoidi, radianti migliorati dal calore; nevralgie, nevrosi spasmodiche.

*Rhododendron 7DH:* dolore strappante reumatico in tutti gli arti; peggiora con il riposo; rigidità del collo, reumatismi delle piccole articolazioni e muscolare, artrite.

*Rhus toxicodendron 12DH:* dolori, rigidità, da sforzo, da umidità, migliorano con il movimento, peggiorano con il riposo; reumatismi, torcicollo, lombaggine, nevriti, nevralgie, sciatica.

## HB 30 URIFLOG



FLOGOSI DELLE VIE URINARIE, CISTITI

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Flogosi acute delle vie urinarie: cistiti, cistopieliti, vescica neurogena.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Berberis vulgaris 7-9DH:* dolore bruciante alla minzione con possibile irradiazione nelle cosce e in regione renale, pollachiuria, uretra urente anche quando non si urina. *Chimaphila umbellata 6DH:* bruciore e calore intenso durante la minzione e successiva tensione; deve sforzarsi prima che arrivi il flusso.

*Uva ursi 6DH:* minzione frequente con spasmi vescicali, dolore bruciante e strappante; urina con sangue, pus e muco tenace; disuria.

*Mercurius corrosivus 10DH:* bruciore intenso e dolore a pugnalata che si estende dall'uretra alla vescica; urina calda e scarsa con secrezione insanguinata.

*Aconitum napellus 30DH:* dolore durante la minzione; urina calda, dal colore rosso; tenesmo, ematuria, ansia ed inquietudine prima della minzione; minzione associata a sudorazione e diarrea.



## PROSTATITI

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Flogosi acute delle mucose genito-urinarie: prostatiti, uretriti, cistiti.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

**Composizione e principi attivi**

*Chimaphila umbellata* 6DH: dolore penetrante in uretra dal collo vescicale al meato, perdita di secreto prostatico, ingrossamento prostatico con irritazione.

*Clematis* 7DH: dolori trafittivi nell'uretra, sensazione di compressione nell'uretra con difficoltà alla minzione, sgocciolio dopo aver urinato, prostatite, orchite, restringimento uretrale.

*Sabal serrulata* 7DH: ipertrofia della prostata, secrezione di fluido prostatico, deficit potere sessuale, coito doloroso al momento dell'eiaculazione.

*Uva ursi* 6DH: minzione frequente con spasmi vescicali, dolore bruciante e strappante; urina con sangue, pus e muco tenace; disuria.

*Staphisagria* 30DH: disturbi della prostata con cistiti, minzione frequente, bruciore in uretra quando non urina, sensazione di mancato svuotamento.

## HB 57 ANEAPP



STATI ANEMICI, DISAPPETENZA, CONVALESCENZA

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Stati anemici con disturbi dell'appetito; dispepsia con flatulenza; convalescenza, stress psico-fisici.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Lycopodium clavatum 60DH:* dimagrimento del tronco, sensazione di pienezza addominale dopo pochi bocconi, meteorismo, eruttazioni, debolezza generale, stanchezza psichica, costipazione, epatopatie,

*China 12DH:* convalescenza dopo gravi malattie infettive, anemia, cattiva funzionalità della milza.

*Arsenicum jodatum 9DH:* dimagrimento, debolezza, anemia.

*Pulsatilla 30DH:* anemia, magrezza, pienezza e pesantezza all'epigastrio postprandiale, alterazioni del ciclo.

## HB 58 EUFLEB



INSUFFICIENZA VENOSA, EMORROIDI, RAGADI, ULCERE VARICOSE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml. Fiale, 10 fiale da 2 ml.

**Indicazioni:** Stasi venosa e portale; insufficienza veno-linfatica, ulcere varicose, tromboflebiti; emorroidi, ragadi anali.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì. Una fiala al giorno o secondo prescrizione.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Aesculus hyppocastanum 15DH:* stasi venosa, varici, stasi della vena porta, tromboflebiti, emorroidi.

*Hamamelis virginiana 12DH:* emorragie e stasi venose, emorroidi, struma vascolare, flebite.

*Secale cornutum 30DH:* arteriopatie degli arti inferiori.

*Calcium fluoratum 12DH:* debolezza del tessuto connettivo, varici.

*Pulsatilla pratensis 60DH:* venostasi, vene varicose, insufficienza venolinfatica, teleangectasie.

**ARTERIOSCLEROSI, IPERTENSIONE, DISTURBI GERIATRICI IN  
GENERE**

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Arteriosclerosi, disturbi geriatrici in genere, ipertensione arteriosa.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

**Composizione e principi attivi**

*Aurum muriaticum natronatum 8DH:* ipertensione, arteriosclerosi, disturbi del SNC in genere.

*Arnica 6DH:* azione antiemorragica, antinfiammatoria, antidolorifica.

*Valeriana 6DH:* nevrasenia, insonnia, cefalea, debolezza nelle gambe, disturbi della trasmissione di stimoli, danni al miocardio, extrasistole, parestesie periferiche.

*Asa foetida 8DH:* ipocondria, meteorismo, sindrome gastro-cardiaca.

*Kalium jodatum 6DH:* arteriosclerosi, processi infiammatori dei tessuti legamentosi e capsulari di tutte le articolazioni, reumatismi muscolari, dispepsia nelle persone anziane, incontinenza urinaria nelle donne, catari cronici delle vie respiratorie superiori.

*Secale 6DH:* arteriti, arteriopatie, Sindrome di Raynaud, emi-cranie vasomotorie, spasmi delle arterie e arteriole.

*Viscum album 6DH:* forme ipertensive, arteriosclerosi, demenza.

## HB 66 PSICOSED



ANSIA, INSONNIA, BOLO ISTERICO, FAME D'ARIA

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Terapia ansiolitica; ansietà, agitazione con sintomatologia psicosomatica: tremore, palpitazioni, bolo isterico, fame d'aria, insonnia, ecc.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Strychnos ignatii 15DH:* distonia vegetativa, depressione, malinconia, emicrania, bolo isterico, cefalee spastiche.

*Asa foetida 12DH:* bolo isterico, meteorismo, ipocondria.

*Gelsemium sempervirens 30DH:* apatia, palpitazioni, sensazioni di spossatezza generale, gastroenterite dopo eccitazione e spavento.

## HB 67 PSICOSTIM



DEPRESSIONE - ATTACCHI DI PANICO

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Depressione, melanconia, fobie e paure, pensieri suicidi, stati di disperazione, attacchi di panico. Indicato nelle distonie neurovegetative, negli stati di esaurimento psico-fisico, nelle difficoltà di apprendimento, nello stress, negli stati di convalescenza. Esplica un'azione neurotonica stabilizzante il sistema neurovegetativo.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Acidum arsenicosum 30DH:* disturbi neurovegetativi, astenia, irrequietezza, paure.

*Aconitum napellus 12DH:* palpitazioni, irrequietezza, paura della morte, eccitazione, angoscia.

*Aurum metallicum 9DH:* depressione, malinconia, disgusto per la vita, eretismo cardio-vascolare.

*Hypericum perforatum 5DH:* depressioni funzionali ed arteriosclerotiche, stati depressivi dopo commozione cerebrale.

## HB 68 DISTONY



DISTONIA NEUROVEGETATIVA: ASTENIA, INSONNIA, PALPITAZIONI. FOBIE

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Tutte le manifestazioni di uno stato acuto o cronico di distonia neuro-vegetativa: tremori, astenia psico-fisica, agitazione notturna, insonnia, palpitazioni, paura e nevrosi fobico-ossessiva. Il preparato ha un'azione tranquillizzante e mio rilassante.

**Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Ignatia 30DH:* distonia vegetativa, depressione, malinconia, emicrania, bolo isterico, cefalee spastiche.

*Gelsemium 15DH:* apatia, palpitazioni, sensazioni di spossatezza generale, gastroenterite dopo eccitazione e spavento, atonia muscolare generale, emicrania, paresi di nervi periferici, vertigini, disturbi visivi.

*Nux vomica 12DH:* ipersensibilità, irritabilità, nervosismo, collera, disturbi dispeptici su base nervosa.

*Arnica 60DH:* insonnia conseguente ad affaticamento fisico o mentale, agitazione.

*Coffea 4DH:* insonnia, emicrania, nevrosi cardiaca, agitazione, intensa attività cerebrale, sbalzi di umore.

## HB 69 PSICO-UP



STATI PSICO-ASTENICI: ALTERAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE  
E DELLA MEMORIA. ANSIA

**Formulazione:** Gocce, flacone da 50 ml.

**Indicazioni:** Tutti gli stati psico-astenici: nevrastenia, difficoltà di concentrazione e di memoria, astenia mattutina, ansietà con abbassamento della soglia dell'attenzione. **Posologia:** 10 gocce tre volte al dì; in fase acuta 10 gocce ogni 10-15 minuti per massimo sei volte.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali:** Nessun effetto collaterale finora riscontrato.

**Interazioni con altri medicinali:** Mai osservate clinicamente.

**Periodo di somministrazione:** Fino alla totale scomparsa dei sintomi o secondo prescrizione.

### **Composizione e principi attivi:**

*Acidum phosphoricum 9DH:* nevrastenia, debolezza di memoria, svogliatezza, difficoltà alla concentrazione, debolezza generale.

*Natrium muriaticum 30DH:* nevrastenia e debolezza generale, distonia vegetativa con disturbi cardiaci, sindrome depressiva, pianto con rifiuto della consolazione, ricerca la solitudine, umore variabile.

*Strychnos Ignatii 9DH:* iperestesia, ipereccitabilità, isterismo, astenia, tremore interno, fame nervosa, tosse nervosa, bolo isterico.

*Kalium phosphoricum 12DH:* nevrastenia, stati generali di spossatezza, debolezza psichica e muscolare, depressione, insonnia nervosa, psicosi.

